

케이엔씨	품 목 명	품목번호	비전
	메타지크림 설명서		211200
규 격	120 x 185mm		
바코드 규격			
글자포인트 7pt	원료약품 및 그 분량, 판매자, 제조자		
글자포인트 7pt	성상, 효능효과, 용법용량, 사용상의 주의사항, 포장단위, 저장방법, 제품문의처, 개정년월 등		
색 상	팬톤Purple C, Black		
지종 / 코팅	70모조		
후가공	-		
비 고			

설명서 사이즈 : 120*185

| 사용설명서

광범위 피부질환 치료제 **메타지** 크림

일반의약품
KGMP
ccm

현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

• 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 읽어 주십시오.
• 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
• 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분

베타메타손빌레이트(KP)	0.61mg
겐타마이신황산염(KP)	1mg(역가)
- 첨가제(보조제)

파라옥시벤조산베틸	1mg
파라옥시조산조판필	1mg
- 기타 첨가제 : 경질유동파라핀, 백색바셀린, 세단올, 소르비탄스테아레이트, 정제수, 팔미트산세틸, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜

【성상】 흰색의 크림제

【효능 · 효과】

- 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환 : 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진(피부스침증), 벡털피부염, 가려움, 건선(마른비늘증)
- 1도 화상

【용법 · 용량】 1일 1~3회 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 세균(결핵, 매독 등)-진균(칸디다증, 박선 등)-스피로테라티속, 호모-바이러스(다상포진, 단순포진, 수두, 종두증 등)-동물(음, 사면발이 등)-성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다) (2) 이 약 또는 이 약 성분에過민증 및 그 병력이 있는 환자. (3) 고막천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치유지연이 나타날 수 있다) (4) 궤양(비체트병 제외). 제2도 심세성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다) (5) 입주위피부염, 보통여드름, 주사(rosacea) 환자 (6) 스트렙토마이신, 칸나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 의한 과민증 및 그 병력이 있는 환자(아미노글리코사이드계 항생 물질사이에는 교차 알레르기유발성이 입증되었다)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 (2) 유·소아

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 침부문서를 소지할 것.

(1) 피부 ① 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진(고름딱지증), 모낭염 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다(밀봉붕대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다). 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용(함께 사용)하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다. ② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부수염, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 발열, 작열감(화끈감), 가려움, 발진·발적(출혈되어 붉어짐), 풍진, 피부건조, 능포(고름물집)성피부염, 땀띠, 상처 악화, 육창, 농포(고름물집증, 괴민증, 피부변색, 다모증(털과다증), 여드름상발진, 색소침착증, 입주위피부염, 알레르기성접촉피부염, 피부짓무름, 2차감염, 피부위축, 줄무늬) 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다. 겐타마이신으로 치료하면 일시적인 피부자극(홍반(붉은 반점), 가려움증)이 나타나지만 일반적으로 치료를 중지할 필요는 없다. ③ 장기연용(계속 사용) : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관 확장, 자반(자주색반점), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면(얼굴)전체에 홍반(붉은 반점), 모세혈관확장, 딱지, 인설(비늘), 어선(鱗癬) 등) 피부변화, 다도, 색소탈실 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 험유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다. (2) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉붕대법에 의해 코르티코이드 전신투여와 같은 뇌하수체-부신(콩팥)부위(콩팥)기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다. (3) 눈·안경(눈꺼풀) 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉붕대법을 사용할 경우 후강하(백내장, 녹내장 등) 등이 나타날 수 있다. 빈도불명의 시야흐림이 나타날 수 있다. (4) 균교대현상 : 국소작용 항생물질제제를 장기간 사용한 경우에 때때로 진균을 포함하는 비감수성균의 균교대현상(superinfection)을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 적절한 처치를 한다. (5) 신장애(신장장애), 난청(귀먹음증)이 나타날 수 있으므로 장기 연용(계속 사용)을 피한다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. (2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다. (3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(콩팥)부위(콩팥)증상(HPA축의 억제, 쿠싱증후군, 고혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉붕대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요증에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA 축 억제를 검증한다). (4) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제 되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다. (5) 치료기간은 질환의 정도나 병소(아픈 부위)의 부위, 환자의 반응에 따라 다르다. 그러나 3~4주 치료 후에도 증상이 개선되지 않으면 다른 질환을 의심해 보아야 한다. 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지된다. (6) 증상이 개선되면 가능한 시일 내에 사용을 중지한다. (7) 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉붕대법을 사용함으로써 코르티코이드제를 전신적으로 투여한 경우와 같은 증상이 나타날 수 있다. 특별한 경우를 제외하고는 장기, 대량사용 및 밀봉붕대법을 피한다. (8) 감작(과민상태)로 만들 수 있으며로 충분히 관찰하고 감작(과민상태)로 만듦(진후(출혈)되어 붉어짐), 부종(부기), 구진, 소수포(물진) 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지한다. (9) 장기 연용(계속 사용)하지 않는다. (10) 코르티코이드 및 겐타마이신은 밀봉붕대법 또는 광범위한 부위 적용, 장기연용(계속 사용)으로 인해 피부를 통해 흡수된다고 알려져 있다. 이러한 경우에는 정기적인 관찰 및 치료에 앞서서 BUN 검사를 통해 신기능 검사가 권장된다. (11) 겐타마이신은 국소투여시 전신적인 효과가 나타나지 않지만, 전신독성을 나타낼 수 있는 농도에서는 신부전환자 또는 제8뇌신경환자에서는 영구적인 전정(前庭) 기능 장애의 원인이 될 수 있다. (12) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다. (13) 국소적으로 투여된 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유증으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의하여야 하며, 수유부에 대한 이 약의 투여가 필요한 정도를 고려하여 수유를 중지하거나 이 약의 투여를 중지한다. (14) 소이는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다. 국소적용 코르티코이드로 차로받은 소이에서 HPA축억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 체중증증의 자연 및 두개골(마리뼈내고혈안)의 발생이 보고된 바 있다. 소이에게서 발견되는 부신억제의 징후는 혈장 코르티솔 수치가 낮아지고 ACTH 자극에 반응이 없는 것이다. 두개내고혈암의 징후로는 솟구멍의 돌출(bulging fontanelle) 등)이 있다. (15) 기저귀 등은 밀봉붕대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다. (16) 소아환자에게 사용할 경우에는 치료 효과를 나타내는 최소 양만을 사용한다. (17) 국소용 코르티코이드의 과다사용 또는 장기사용 시 뇌수체-부신(콩팥)부위기능을 억제하여 2차적인 부신(콩팥)증상을 유발하고 쿠싱증후군을 포함하는 고코르티솔증을 유발시킬 수 있다. 겐타마이신을 국소로 과다 또는 장기간 사용하였을 때는 평소(아픈 부위) 부위에 진균 또는 비감수성 균의 과도한 증식이 일어날 수 있다. 이러한 경우 적절한 대처(증상에 대응하여 치료가 필요하다. 급성 고부신 (콩팥)증상(콩팥)증상(hypercortisolism symptoms)은 보통 가역적이다. 필요할 경우 전해질 불균형을 치료하여야 한다. 만성독성인 경우 코르티코이드를 서서히 감량(줄임)하여 중단하여야 한다. (18) 건선(마른비늘증)환자에게 장기, 대량 사용할 경우에는 치료 중 또는 치료중지 후에 건선(마른비늘증)성 화증(흉터), 농포(고름물집증)성 건선(마른비늘증) 등이 나타난다는 보고가 있다. (19) 전신 및 국소 코르티코이드 사용 시 시작장애가 보고될 수 있다. 만약 환자에서 시야흐림 또는 기타 시각장애와 같은 증상이 나타나면 전신 및 국소 코르티코이드 사용 후에 보고되었던 백내장, 녹내장 또는 중상성장액(맥락막)병증(central serous chorioretinopathy (CSCR))과 같은 드문 질환을 포함하여 시각장애를 일으킬 수 있는 원인을 확인하기 위하여 안과전문의에게 진료받을 것을 고려해야 한다.

6. 적용상의 주의

(1) 장기연용으로 사용하지 않는다. (2) 환장이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다. (3) 의사의 감독없이 밀봉붕대법을 사용하지 않는다. 특히 밀봉붕대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부(질환부위)를 청결히 한다.

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. (2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【포장단위】

35g/튜브

【저장방법】

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(출혈)되어 붉어짐), 가려움이) 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 작성연월일(2021년 12월 15일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaiapharm.co.kr>)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 14-3330, 1644-6223)

◆ 제조의뢰자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979

사용설명서 작성연월일 2021년 12월 15일

◆ 제조자 : 시미씨엠오크리아주식회사

경기도 부천시 옥산로 230번길 23

211200