



제품 개봉 시 또는 취급시에 포장지재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

분류번호: 264  
일반의약품



10매입

24시간 지속효과

# 디나펜<sup>®</sup> 플라스타

(디클로페낙나트륨)

빠르고 시원하게

퇴행성  
관절염

테니스  
엘보

근육통  
어깨통증

외상(상처)  
후 통증





## [원료약품 및 그 분량] 1매(70cm, 2.4g) 중

디클로페낙나트륨(BP) ..... 15mg

[성상] 무색투명 내지 미황색(연노랑)의 점착성 물질을 지지체에 도포하고(바르고) 고체면에 고체 피복물을 덮은 척부제이다.

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통, 소염(항염) 1) 퇴행성 관절염(골관절염) 2) 아يك관절 주위염 3) 힘줄 및 힘줄 유팽마염 4) 힘줄주위염 5) 위팔뼈상관절(테니스 앤보 등) 6) 근육통(근, 근막성)(여리)통증 등) 7) 외상(상처) 후 부기 및 통증

[용법·용량] 성인(15세 이상): 1일 1회 1매를 환부(질환부위)에 붙입니다. 단, 15세 미만은 사용하지 않 습니다.

### [사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약의 성분에 과민반응의 병력이 있는 환자 2) 이스파린 또는 기타의 비스테로이드 소염제(항염증제)에 대한 천식(비스테로이드 소염제(항염증제)에 의해 유발되는 천식 발작) 또는 그 병력이 있는 환자(천식(상호증상) 천식 발작을 유발할 우려가 있습니다.) 3) 이스파린 또는 기타의 비스테로이드 소염제(항염증제)에 과민반응 환자 4) 15세 미만의 어린이(어린이에 대해서는 안전성이 확립되어 있지 않습니다.) (사용경향이 적습니다.)

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오. 디클로페낙 제제나 비스테로이드 소염제(항염증제)를 구소적으로 적용하거나 복용하지 마십시오.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 기관지 천식 환자(기 관지 천식환자 중에 아스피린 천식도 포함되어 있으며, 그들 환자에서 종종(상호증상) 천식 발작을 유발할 우려가 있습니다.) 2) 감염을 동반한 엄증의 사용할 경우(폐기감염증의 증상이 나타나지 않을 우려가 있으므로 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께복용)하고, 치료를 충분히 하여 신속히 사용하십시오.) 3) 만성질환(비행성관절염(관절관절염) 등) 사용을 할 경우(약물로써 이의 오류도 고려하여, 환자 상태를 충분히 관찰하고 이상반응 밝힌(드러낸)에 유의하십시오.) 4) 일부(1) 임신 3기: 프로스테란дин 합성저해로 인해 출산이 지연될 수 있으며, 출산 시 실험, 신생아출혈, 태아의 심장发育(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능 저하로 양수소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 일부는 사용하지 마십시오. (2) 임신 1기 및 2기: 동맥의 생식수술 결과 태자도상은 발생하지 않았으나 일부에 대한 연구는 아직 밝혀진 바 없습니다.) 5) 수유부: 영아(젖먹이)에 대한 위해 여부는 아직 밝혀진 바 없으나 이 약이 모유로 이행한다고 수유부는 사용하지 마십시오. (6) 고령자(노인)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하여 주십시오. 1) 피부: 광선과민반응, 부종(부기), 피부부찰, 습진, 피부건조, 때때로 피부염, 가려움, 충혈되어 붉어짐, 거칠어짐, 자극감, 드물게 수포형성, 색소침착 등 특히 중대한 이상반응으로 접촉피부염은 이 약을 사용한 부위에 충혈되어 붉어짐, 붉은 반점, 발진, 가려움, 통증 등의 피부증상이 나타나거나 부종(부기), 수포, 미란진(짓무름) 등으로 악화되며, 애너가 전신으로 확산되어 신체에 심해질 수 있으므로 이상이 확인된 경우에 즉시 사용을 중지하고, 적절한 처치를 하십시오. 2) 기타: 매우 드물게 과민반응, 혈관신경부종(부기), 천식 등

5. 기타 이 약의 사용에 주의할 사항 1) 소아(항염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아니라 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이라는 점을 유의하여 주십시오.) 2) 이 약 사용 2주 후에는 이 약에 대한 재검토가 이루어져야 합니다. 3) 눈 및 점막에는 사용하지 마십시오. 4) 손상된 피부, 습진 또는 발진이 난 부위에는 사용하지 마십시오. 5) 팔봉등대법으로 사용하지 마십시오. 6) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시 적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의하십시오. 7) 뉴카놀론계 항균제(에녹사신 등)와

병용(함께 복용)시 경련을 일으킬 우려가 있으므로 경련이 나타나 경우에는 기도를 확보하고, 디아제팜의 경맥주사 등의 차단을 하십시오. (뉴카놀론계 항균제가 노안의 약제성 신경 전달물질인 GABA의 수용체 결합을 높도 의존적으로 차해하고, 일부 비스테로이드 소염제(항염증제)와의 공존하에서는 그 저 해작용이 증강되는 것이 동물실험으로 보고되었습니다.) 8) 올바르게 사용하지 않거나 갑자기 과량을 사용하면 저혈압, 신부전, 경련, 위장관 불쾌감 및 호흡기 기능 악화 등의 전신 이상반응이 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 비스테로이드 소염제(항염증제)의 일반 해독법을 사용합니다. 이 처치법은 대증적 보조요법(증상별로 적용하는 보조방법)입니다.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기나 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 의약품은 원래 용기에서 개개인 다른 용기へ에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

### [저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)이하 보관 [포장단위] 10매

- ※ 환부(질환부위)를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- ※ 건조하거나 연약한 피부 또는 모발이 많은 부위에 부착한 경우에는 미온수로 적당히 불려서 떼어내십시오.
- ※ 사우나, 운동장 전후에는 피부 각질이 억제되고 내피가 순상되기 쉬우므로 본 제품 부착 시 주의하십시오.
- ※ 동일 부위에 연속적으로 부착하는 것은 기습적 피하십시오.
- ※ 가려움이 있는 즉시 떼어내고 환부(질환부위)를 흐르는 친물에 담가두거나 얼음으로 냉찜질을 하여 주십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- ※ 오용(잘못사용)을 막고 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한을 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 고하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 아래에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 제품 기재사항 개정년월(2015년 02월) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품 문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

♣ 제품문의처: 1666-9979

제품기재사항 개정년월: 2015.02

### 제조의뢰자: 현대약품주식회사

충청남도 천안시 동남구 풍세면 임야리길 55

### 제조자: 신일제약주식회사

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28



8 806420 030519

제조번호:

사용기한:

