

디자인앤드	품 목 명	품목번호	버전
		베세틴액 라벨 / 1L	700227
규 격	가로:180mm 세로:105mm		
인 쇄 규 격	가로:43mm 세로:12mm 분리배출/바코드 8mm		
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC126, DIC9, DIC582(맥)		
지 중 / 코팅	아트지 / 기계코팅(불면) 또는 상용		
후 가 공	없음		
비 고			



분류번호
261
일반의약품
KGMP

찢긴 상처·화상 살균 소독에

베세틴액 1L

(포비돈요오드)

- * 이 약을 사용하기 전에 제품라벨에 기재된 사항을 자세히 읽어 주십시오.
- * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

【원료약품 및 그 분량】 100mL 중
 ■ 유효성분 : 포비돈요오드 (EP)..... 10g (유효요오드로서 1000mg)
 ■ 기타 첨가제 : 농글리세린, 무수인산수소나트륨, 수산화나트륨, 시트르산 이염기-코630, 정제수

【성 상】 황갈색의 액체
【효능·효과】 찢긴 상처, 화상, 창상(상체의 살균 소독, 궤양, 농양·괴저의 살균 소독, 감염 피부면역의 소독, 수술부의 살균 소독, 주사 및 카테터 부위의 소독
【용법·용량】 1일 수회(여러차례), 환부(질관부위에 적당량 바른다.
【사용상의 주의사항】
 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 이 약 및 이 약 성분과 과민증 환자 2) 감작성 기능이상 환자(특히 결절성 감작성증, 자반병성 감작성증, 허시모트 감작성증 등) 3) 신부전 환자 4) 신장 및 6개월 미만의 영아(갓난아기) 5) 포진물집상 피부염 환자 6) 방사성 요오드 치료 전후 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 중증심한 증상의 환자(화상 환자 등) 2) 감작성 질환의 병력이 있는 환자 3) 신부전의 병력이 있는 환자 3. 부작용 1) 과민증 : 드물게 알러지성 발진, 두드러기 등, 요오드진(iododerma) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지한다. 2) 피부 : 때때로 동통(통증), 가려움, 자극감, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 드물게 적열감(화끈감), 피부괴양, 접촉피부염, 피부반석, 장기간 사용시 상처 치유 저해가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 심할 경우는 사용을 중지한다. 3) 전해질 대사 : 화상치료의 경우처럼 많은 양을 투여시 전해질 및 염분의 삼투압 장애, 대사성 산증이 나타날 수 있다. 4) 신장 : 화상치료의 경우처럼 많은 양을 투여시 신부전을 일으킬 수 있다. 5) 혈액 : 장기간 사용시 사당하부노화수채·감작성·축기능의 변화와 기역반응에 의한 요오드의 분비량 증가가 나타날 수 있다. 또한 열적 감작성 자극 호르몬의 분도

가 약간 상승하고 T4 및 T3 감소가 나타날 수 있다. 6) 대량 투여 : 대량 또는 장기간의 접촉으로 일부 환자에서 일시적인 혈청 요오드 결합단백의 증가 보고가 있다. 광범위한 상처 또는 화상에 이 약의 반복적 투여로 요오드의 전신 흡수에 따른 여러 부작용(근육 약화, 두통, 타액 분비 증가, 목과 입에서의 적열(화끈감) 및 동통(통증), 눈의 자극 및 부종(부기), 피부반응, 배탈, 설사 및 폐 부종(부기)으로 인한 호흡곤란)이 나타날 수 있다. 7) 기타 : 소독용으로 이 약을 과량 사용시 요오드 독성이 있다. 4. 일반적 주의 1) 분만 직전에 사용한 경우에는 분만 후 락토제 분비 시 양의 눈을 씻어주고 목욕시 부채되지 않도록 한다. 2) 이 약에 의한 치료는 보존적 치료임을 유의하고 증상의 개선 경향이 보이지 않을 경우는 외과적 요법 등을 고려한다. 3) 광범위한 화상을 입은 환자에게 이 약을 사용할 경우 수분공급이 충분히 이루어져야 한다. 산염기 대사 및 신기능을 관찰해야 하며 대사성 산증이나 신기능 이상이 있을 경우 이 약의 사용을 중지한다. 4) 이 약을 화상에 의한 궤양에 사용할 경우 화상 후의 2차 손상에 의해 발생하는 궤양에만 사용하며 새로 발생한 화상에 대해서는 다른 적절한 요법을 고려한다. 5) 이 약은 성명 활성성을 이용한 감작성 진단에 영향을 줄 수 있으므로 이 약의 투여와 성명도 조사는 1~2주의 간격을 두고 실시한다. 또한 이 약의 투여 중에는 감작성 기능이 기역적으로 변화될 수 있으므로 주의한다. 6) 이 약은 요오드 함유 제제(대량 투여 및 장기 연용(계속사용)시에는 감작성 기능 이상에 주의한다. 7) 감염병(박막염, 결수염 등) 발생 시에는 이 약의 사용 전 생리 식염수로 세정한다. 이 약의 접촉으로 박테리아로부터 내독소가 유리될 위험이 있다. 8) 드물게 속(아나필락시)이 일어날 수 있으므로 사용후 갑자기 가려움, 부종(부기), 가슴쓰림 등과 동시에 안색蒼백, 수축냉감(손발이 찬느낌), 식은 땀, 숨가쁨 등의 중증심한 증상의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다. 5. 사용중지 1) 리튬 치료를 받고 있는 환자에게는 이 약의 규칙적인 사용을 피한다. 리튬 치료와 병용할 경우 감작성 기능 항진 효과가 나타날 수 있다. 2) 콜로이드인, 설파다이진·은화합물, 알칼리, 수은 함유한 제제와 병용할 경우, 이 약의 사용 전 생리 식염수로 세정될 수 있으며 이는 변색을 통해 알 수 있다. 3) 호소 성분은 상처 치료제와 병용할 경우 호소의 효과가 상실된다. 4) 이 약은 과산화수소와 병용할 경우 사용하지 않는다. 6. 일반 및 수유부에 대한 투여 1) 일반 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에 규칙적 장기간 또는 광범위하게 사용하지 않는다. 2) 흡수된 요오드는 대변장벽을 통해 유즙으로 이행된다. 흡수된 요오드는 태아나 신생아의 감작성 기능에 영향을 미치거나 감작성증을 일으킬 수 있다. 따라서 신생아 또는 영아(갓난아기)의 경우 감작성 기능을 점검하는 것이 권장된다. 7. 임신중지(사태)의 영향 : 건강한 또는 손상된 피부를 통해 이 약의 요오드가 흡수되면 감작성 기능 시험을 방해한다. 8. 과량 투여시의 처치 1) 증상 : 다량의 요오드를 경구복용(한약) 경우 다음과 같은 증상이 나타날 수 있다. ① 상복부통증, 구역, 구토 및 설사, 변질(산성)감다움, 복부경련 ② 긴장감, 빈맥(빠른맥), 청색증, 두통, 어지러움, 헛소, 하혈 및 혼수 ③ 구강안인 염막의 갈색화, 비염(코염), 기면(잠) 위염, 출혈을 동반하는 점막손상, 성문(항문)부종(부기), 신장출혈, 무뇨증, 치명적 혈관 운동성 허탈 등이 나타날 수 있다. ④ 과다한 요오드는 감작성증 및 감작성 기능저해 또는 항진을 나타낼 수 있다. 2) 처치 ① 해독을 위해서는 전분과 단백질 함유 음식을 섭취하는 것이 권장된다. 필요한 경우 3시간마다 5% 티오황산나트륨수화물 용액 투여를 하거나 10% 티오황산나트륨수

화물 10mL를 정맥주사한다. ② 고요적 또는 사교로 다량 섭취한 경우 전해질 평형, 신장 및 감작성 기능에 특히 주의하여 대증요법(중성염로 치료하는 방법) 및 지지요법을 실시한다. 9. 적용상의 주의 1) 안약용 및 내복용으로 사용하지 않는다. 약액이 눈에 들어가지 않도록 주의하고 눈에 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 씻어낸다. 2) 다른 제제와 혼합해서 사용하지 않는다. 3) 환부(질관부위)를 깨끗이 씻고 소독한다. 중증심한증상의 창상상처에 사용하는 경우 희석액으로는 주사용 증류수 또는 멸균정제수를 사용한다(수도물이나 정제수를 사용하지 않는다.). 4) 의복 등에 이 약이 묻었을 경우 즉시 세탁하면 물로 쉽게 씻겨진다. 합성섬유의 경우 알코올수 또는 티오황산나트륨수화물액으로 지울 수 있다. 5) 비누는 이 약의 살균작용을 약화시키므로 충분히 씻어 제거한 후 사용한다. 6) 건조되면 전기 절연성이 되므로 전기메스를 사용하는 경우에는 이 약이 대금과 피부 사이에 끼어들지 않도록 주의한다. 10. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하여 보존한다. 2) 저장기간은 금속제를 사용시 요오드의 산화 특성에 의해 부식될 수 있다. 환상수지는 일반적으로 사용가능하나 대부분 기역적 변색은 나타날 수 있다. 11. 기타 : 1) 약제 사용시 약중 무기 요오드 및 열중 총 요오드치가 상승되었다는 보고가 있다. 【포장단위】 1L, 3.7L. 【저장방법】 차광 기밀용기, 실온(15~30°C)보관 ※ 본 제품을 먹거나 눈에 바르지 마십시오. 만약 모르고 먹었을 경우 즉시 의사 또는 약사의 상의하십시오. ※ 오용(잘못사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서는 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오. ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 제품라벨에 표시된 제품 문의처로 문의하십시오. ※ 이 제품(제사)의 개정연월일(2019년 07월 05일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundapharm.co.kr>)나 제품문의처 ☎ 1666-9379)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약리물안전관리원 ☎(1644-6223)

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9379
 제품(제사)의 개정연월일 : 2019. 07. 05
제조사 : 현대약품주식회사
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 진다리길 55

 (01)08806420004411

 HDPE
 두광:PP
 700227-190701

제품번호 : 무코팅
 사용기한 :