

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	베세틴스크립세액 라벨 / 1L	700228	190701
규격	가로:180mm 세로:105mm		
인쇄규격	가로:40mm 세로:12mm 분리배출/바코드 8mm		
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	DIC201, DIC582(검)		
지증/코팅	아트지 / 기계코팅(불변) 또는 상응		
후가공	없음		
비고			

700228-190701



분류번호
261
일반의약품
KGMP



제조자:
K-Inno
Pharm
KOREAN INNOVATIVE PHARMACEUTICALS CO., LTD.

수술 전처리 살균 소독에
베세틴스크립세액
(포비돈요오드) 1L

* 이 약을 사용하시기 전에 제품라벨에 기재된 사항을 자세히 읽어 주십시오.
 * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중
 ■ 유효성분: 포비돈요오드 (EP) 7.5g (유효요오드로서 750mg)
 ■ 기타 첨가제: 뉴트로닉스S-60 솔루리C-24, 수신하나트륨,
 슈파이아이드 L-9, 정제수

[성상] 흰색 액체
 [효능·효과] 수술기의 손 및 팔의 살균 소독, 수술부위 살균 소독
 [용법·용량] 수술기의 손·팔의 살균 소독: 이 약 5mL를 취하여 손과 팔에 약 5분간 잘 문질러 거품을 충분히 낸 후 흐르는 물로 청진하여 씻어낸다. 수술부위의 살균 소독: 이 약을 적절히 바르거나 또는 적분방을 사용하여 잘 문질러 거품을 충분히 낸 후 멀리 헹구거나 닦아낸다.
 [사용상의 주의사항]
 1. 다음 환경에는 투여하지 말 것
 1) 이 약 및 이 약 성분에過민증 환자 2) 갑상선 기능이상 환자특히 결장성 갑상선증, 자발성 갑상선증 환자 3) 흰색인자증 환자 4) 신생아 및 6개월 미만의 영아(간이아) 5) 포진환자(부비강 환자) 6) 방사성 요오드 치료 전후 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 중증(나쁜증상)의 환자(화상 환자 등) 2) 갑상선 질환의 병력이 있는 환자 3) 신부전의 병력이 있는 환자 3. 부작용 1) 과민증: 드물게 아나필락시양 증상(호흡곤란, 호흡(窒息), 두드러기 등), 오드레신(oedema) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지한다. 2) 피부: 때때로 둘둘(통증) 가려움, 자극감, 발진, 벌집(총털도어 벌어짐), 피부염, 드물게 직렬감(화끈감), 피부가疼, 접촉피부염, 피부변색, 장기감 사용시 상처 치유 저해가 나타날 수 있다. 이러한 증상이 심할 경우는 사용을 중지한다. 3) 전립질 대사: 화상치료의 경우처럼 많은 양을 투여시 전해질 및 혈청의 설탕수치 장애, 대사성 증상이 나타날 수 있다. 4) 신장: 화상치료의 경우처럼 많은 양을 투여시 신부전증을 일으킬 수 있다. 5) 혈액: 장기간 사용시 시상하제와 혼합해서 사용하지 않는다. 3) 환부질환 부위를 깨끗이 씻고 소독한다. 중증(나쁜증상)의 환자에게 사용하는 경우의 희석액으로는 주사용 증류수 또는 별도 정제수를 사용(다수도물이나 정제수를 사용하지 않는다.). 4) 의복 등에 이 약이 묻었을 경우 즉시 세탁하면 물로 쉽게 씻겨진다. 합성상유의 경우 암모니아수 또는 티オ황산나트륨수화물액으로 지울 수 있다. 5) 바누르는 이 약의 살균작용을 악화시키므로 충분히 씻어 제거한 후 사용한다. 6) 건조되면 전기 절연성이 되므로 전기 메스를 사용하는 경우에는 이 약이 대구면과 피부 사이에 끼어들지 않도록 주의한다. 10. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하여 보관한다. 2) 저온으로 금속제를 사용시 요오드의 산화특성을 해제해 부식될 수 있다. 환경수지는 일정적으로 사용 가능하나 대부분 기역적 변성은 나타날 수 있다. 11. 기타: 질내에 사용으로 혈증 무기 요오드치 및 혈증 총 요오드치가 상승되었다는 보고가 있다.

[포장단위] 1L, 3.78L
[저장방법] 기밀용기, 차량간냉보관
 ※ 본 제품을 먹거나 농에 바르지 마십시오.
 ■ 만약 모르고 먹을 경우 즉시 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 ■ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 ■ 오용질물(식물)을 막고 물질을 보호 유지하기 위해서는 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 ■ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ■ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 제품라벨에 표시된 제품 문의처로 문의하십시오.
 ■ 이 제품 기자사랑 개장연월 2019년 07월 05일 이후 변경된 내용은 현대약품주(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처 ☎ 1666-9979에서 확인하실 수 있습니다.
 ■ 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 ☎ 1644-6223

◆ 제품문의처: ☎ 1666-9979
제품 기자사랑 개장연월: 2019. 07. 05

제조자: 현대약품주식회사
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 진단리길 55



현대약품(주)



(01)08806420004312



HDPE
뚜껑:PP

제조번호 :

무 코 텅

사용기한 :

14mm

45mm