

디자인앤드	품 목 명	품목번호	버전
	갈타제산 설명서	701282	220905
규 격	가로:160mm 세로:152mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	전문약품, 원료약품 및 그 분량, 제품명		
글자포인트 7pt	주소, 성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC68, DIC582(4원색)		
지 종 / 코팅	70모조		
후 가 공	없음		
비 고			



현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

유아용설사치료제 갈타제산[®]

(베타-갈락토시다제(아스퍼길루스))

사용설명서

일반약품

KGMP

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중
 ■ 유효성분 : 베타-갈락토시다제(아스퍼길루스)(JP) 5,000 ONPG단위
 ■ 기타 첨가제 : 덱스트린

[성 상]
 백색 - 담황색의 가루로 특이한 냄새가 있으며 약간 단맛이 있다.

[효능·효과]
 유아의 유당(젖당)불내에 의한 소화불량의 개선
 1. 1차성 유당(젖당)불내증
 2. 2차성 유당(젖당)불내증 : 단일중후성 설사, 급성소화불량증, 감기성 설사, 백색변성 설사, 만성설사, 미숙아·신생아의 설사
 경관영양식, 경구먹는다, 복용한다)유동식등의 섭취시 유당(젖당)불내에 의한 설사의 개선

[용법·용량]
 • 유아의 유당(젖당)불내에 의한 소화불량의 개선 : 베타갈락토시다제로서 1회 1,250~2,500 ONPG단위를 수유시 함께 경구투여한다.(먹는다, 복용한다) 모유영양의 경우에는 소량의 물에 녹여 수유도중에 투여하고, 인공영양의 경우에는 분유에 타서 투여한다. 이때 조유온도는 50℃를 넘지 않게 주의한다.
 • 경관영양식, 경구먹는다, 복용한다)유동식 등의 섭취시 유당(젖당)불내에 의한 설사의 개선 : 섭취유당(젖당)량 10g에 대하여 5,000 ONPG단위를 식사와 함께 투여한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]
 1. 다음의 환자에는 신중히 투여할 것
 본인 또는 양친, 형제에 두드러기, 기권시 천식, 다른 약물에 대한 과민증, 음식물 알레르기 등이 나타나는 환자
 2. 부작용
 1) 속 : 드물게 속증상(사자냉감(팔다리 찬느낌), 안면(얼굴)창백, 청색증, 설사, 복부(배부)팽만, 구토 등)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를

중지하고 증상에 따라 수액, 부신피질호르몬제 투여 등 적절한 처치를 한다.
 2) 과민증 : 드물게 발진이 나타날 수 있다.
 3) 소화기계 : 드물게 변비, 복부(배부)팽만, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의
 1) 유당(젖당)불내로 판단되는 환자에 대해 사용한다.
 (1) 유아의 경우에는 변의 pH 및 변중의 당을 측정하여 원칙적으로 다음 사항을 기준으로 하여 사용한다.
 • 변의 pH가 5.5 이하
 • 변의 pH가 5.6~6.5이고, 변중의 당이 크리니테스트에 의해 +이상
 • 변중의 당이 크리니테스트에 의해 +2이상
 (2) 1회 식사중의 유당(젖당)량이 원칙적으로 보통 20g이상의 경관 영양식 또는 경구먹는다, 복용한다)유동식을 섭취하고 있는 환자로서 설사, 기타 유당(젖당)불내에 의한다고 생각되는 증상을 일으키는 경우
 2) 변상태의 개선, 배변횟수의 감소가 나타나지 않을 경우에는 투여를 중지한다.

[저장방법] 기밀용기, 건냉소
 ※ 역가감소의 우려가 있으니 반드시 건냉소 또는 냉장소에 보관하십시오.

[포장단위] 60g
 * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
 * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
 * 이 사용설명서 개정연월일(2022년 09월 01일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처 ☎ 1666-9979에서 확인할 수 있습니다.
 * 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 ☎ 14-3330, 1644-6223

제조사 : 현대약품주식회사
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55



☎ 제품문의처 : 1666-9979
 사용설명서 개정연월일 : 2022. 09. 01

701282-220905