

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	클리눔질정(데쿠알리눔염화물) 설명서	701656	200202
규격	가로: 160mm 세로: 152mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 6pt	성상, 효능 · 효과, 용법 · 용량, 주의사항, 저장방법 행간 : 7pt		
색상	DIC582(백), DIC101		
지종 / 코팅			
후기공			
비고			

사용설명서



**클리눔®**  
(데쿠알리눔염화물)

분류번호  
255  
전문의약품  
KGMP

현대약품은 제약업계 최초로  
CCM 인증 기업으로서  
소비자 중심 경쟁을 실천합니다.

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

**[원료약품 및 그 분량]** 1정 중  
 ■ 유효성분 : 데쿠알리눔염화물(EP) ..... 10mg  
 ■ 동물유래성분 : 스테아르산마그네슘(소의 우유)  
     유당수화물(소의 우유)  
 ■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스

**[성상]** 흰색 또는 거의 흰색의 양면이 불록한 타원형 질정

**[효능 · 효과]** 세균성 및 진균성(칸디다성) 질염

**[용법 · 용량]**  
 1일 1회 1정을 연속 6일간 저녁 취침 전에 질 내 깊숙이 삽입한다.  
 삽입을 용이하게 하기 위해, 바로 누운 자세에서 다리를 약간 구부린 자세에서 삽입한다.  
 월경 기간에는 투여를 중단하고 월경이 종료된 후 투여를 계속한다.  
 6일 이전에 투여를 중단할 경우 재발할 수 있으므로, 증상 호전이 관찰되더라도 6일간 투여를 지속한다.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
  - 1) 이 약의 주성분 또는 구성성분에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
  - 2) 질 또는 자궁경부에 궤양이 있는 환자
  - 3) 초경 이전 소아
  - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 1) 18세 미만 및 55세 이상 여성
  - 2) 임신 초기 3개월 미만인 일부
3. 이상반응
  - 1) 임상시험에서 보고된 이상반응은 다음과 같다.

기관	흔함 (≥1/100에서 <1/10)	흔하지 않게 (≥1/1,000에서 <1/100)
비뇨생식기계	질 분비물 외음부 가려움증 외음부 적열감	질 출혈, 질 통증
감염	질 칸디다증	세균성 질염 진균성 피부 감염 외음부 질염
신경계		두통
소화기계		구역질

2) 해외시판 후 조사에서 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

  - 가) 비뇨생식기계 장애 : 질점막 궤양, 자궁출혈, 발적, 질건조
  - 나) 감염 : 방광염
  - 다) 전신 : 발열, 알레르기반응
  - 3) 만약 본 반응이 점점 더 중증하게 나타날 경우 혹은 본 사용설명서에 기재된 부작용 외 다른 부작용이 나타날 경우 의사나 약사와 상담한다.
4. 일반적 주의
  - 1) 이 제품을 사용하는 동안에는 질세정제, 살정자제, 비누를 사용하지 않는다.

701656-200202

2) 이 약의 치료기간 동안은 보호되지 않는 성관계를 하지 않는 것이 좋다.

3) 이 약은 라텍스 재질의 콘돔 기능에 영향을 미치지 않으나, 비라텍스 콘돔, 격막 피임법과 같이 사용한 경험은 제한적이다. 따라서, 이 약 투여 중에는 비라텍스(free-latex)콘돔, 격막 피임의 피임방법은 권장되지 않는다.

4) 월경 기간 동안 약물 치료를 중단하고, 월경이 종료된 후 치료를 시작한다.

5) 권장 용량 및 치료기간을 초과하여 사용할 경우 질 궤양의 위험을 증가시킬 수 있다.

**5. 임부, 수유부에 대한 투여**

- 1) 임부
 

임부가 참여한 관찰 연구 및 해외 시판 후 사용경험에서 이 약의 질내 투여에 의한 태아 및 임부에 미치는 부정적인 영향은 관찰되지 않았다. 따라서, 필요한 경우 의사와 상담을 통해 임신 중 사용할 수 있다. 그러나, 이 약의 태아 노출을 최소화하기 위해 분만 전 12시간 이내에는 이 약을 사용하지 않도록 한다.
- 2) 수유부
 

이 약의 모유이행에 관한 자료는 없으나, 이 약을 6일간 질내 적용 후 전신을 통해 모유로 이행되는 양은 무시할 만한 수준으로 판단된다.

**3) 수태능**

이 약의 수태능에 미치는 영향에 대한 자료는 없으므로, 임신을 계획하고 있는 가임여성이나, 임신 초기 3개월 여성은 이 약 투여 전 의사와 상담하도록 한다.

**6. 소아에 대한 투여**

초경 이전 소아에는 투여하지 않는다. 18세 미만에 대한 안전성 · 유효성은 확립되어 있지 않다.

**7. 과량투여시의 처치**

- 1) 과량투여 또는 투여기간 지연은 질 궤양의 위험도가 증가한다.

**제조자 :** 현대약품(주)  
 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979  
 사용설명서 개정연월일 : 2020. 03. 02