

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	엘라원정30mg 설명서/CENEXI	190502	
규격	가로125mm 세로:250mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 6pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	PANTONE286, PANTONE247		
지증 / 코팅	70g 모자리 또는 상응하는 지증		
후기공	없음		
비고			

사용설명서  
수입의약품



현대약품은 제약업계 최초로  
CCM 인증 기관으로서  
소비자 중심 경쟁을 실현합니다.

## 응급피임약 엘라원정 (율리프리스탈아세테이트)

- \* 이 약을 복용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- \* 이 약은 한번에 1정을 경구 복용하십시오.
- \* 이 약의 복용이 100% 피임 성공을 의미하는 것은 아닙니다.

### 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 율리프리스탈아세테이트(별규) ..... 30mg
- 동물유래성분 : 유당수화물(소의 젖)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 정제수, 크로스카르멜로우스나트륨, 포비돈 K30

### 【성상】 백색 내포 흑백색의 원형정제

【효능·효과】 무방반한 성교 또는 피임방법의 실패로 인한 경우, 성교후 120시간(5일) 이내에 즉시 사용하는 응급피임약

【용법·용량】 무방반한 성교 후 또는 피임의 실패 후 가능한 한 빨리, 늦어도 120시간(5일) 이내에 이 약 1정을 복용한다. 복용 후 3시간 이내에 토했을 경우에는 즉시 이 약 1정을 다시 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있으며 월경주기 중 어느 시점에서도 복용할 수 있다.

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 경고

- 1) 이 약은 응급피임제로서 혼인적 요법으로 이용되어야 하며, 일반적인 피임방법을 대신하여 사용하지 말 것.
- 2) 모든 경증의 임신이 병지될 수 있는 것은 아니므로, 월경예정일에 비정상적인 출혈 혹은 예정일에서 7일이 지나도 월경이 없거나 임신의 증상이 있을 경우에는 임신 가능성을 고려하여 반드시 임신검사를 받아야 한다.

#### 2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 약의 주성분인 율리프리스탈이나 다른 부형제에過민증이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 혈증(Galactose intolerance), Lapp 유당불내증(� lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(Glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제로 있는 환자는 투여하지 않는다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
  - 1) 자궁 외 임신 위험 있는 경우 : 이 약 복용후 하복부 통증이 있는 경우 자궁외 임신의 가능성을 고려해야 한다. 이후 임신 상태 및 건강상태에 대한 추적 검사가 권장된다.
  - 2) 경구용 글루코코르티코이드에 의해 조절되지 않는 증증의 천식 환자
  - 3) 출산의 간접적 환자
  4. 이상반응
    - 1) 263명을 대상으로 한 임상시험에서 대부분의 이상반응은 경증 혹은 중등도이며 이러한 이상반응은 곧 회복되었다.

	매우 흔함 > 1/10(명/년)	흔함 1/100 ~ 1/10(명/년)	흔하지 않음 1/1000 ~ 1/100(명/년)	드물 1/10000 ~ 1/1000(명/년)
감염			질염, 코인두염, 인플루엔자, 요로감염	결막염, 다래기, 글빈염질환
대사 및 영양장애			식욕 이상	탈수
정신건강장애		기분 장애	정신장애, 불안, 불면증, 과다활동장애, 성욕 이상	방향감장애
신경계장애	두통, 현기증	기면, 편두통	떨림, 주의력장애, 이상미각, 수면의 질지하, 이상후각, 실신	
눈		시각장애	눈의 이상증상, 안구충혈, 눈부심	
귀 및 미로계장애				현기증
혈관장애			인면 혈조	
호흡기계 흉과, 종창동장애				출혈
위장관장애	구역, 복통, 복통(상부) 복부불쾌감, 구토	복통(하부), 실사, 입마름, 변비, 소화불량, 고장	상기도 유행, 기침, 인후 건조, 코피	
피부 및 피하조직장애		여드름, 피부번병, 가려움		두드러기, 엉부소양증
근골격·결합조직장애				사지통증, 관절통
신장·뇨도계장애				요로장애, 착생뇨
생식기계·유방장애		월경통, 골반통, 유방 압통	월경과다, 질분비물, 월경장애, 질출혈, 안면홍조, 월경진증후군	임상결석증, 신통, 방광통 임부소양증, 기능장애자궁 출혈, 성교통증, 난소낭증 파열, 외음질증, 월경불폐감, 월경과소증
전신장애 및 투여부위 상태	피로	통증, 과민성, 오한, 컨태, 말걸	흉부불쾌감, 염증, 갈증	

2) 임상시험에 참여한 대부분의 여성(74%)은 월경예정일에서 7일 이내에 월경을 경험하였다. 반면 6.8%는 월경예정일에서 7일 이전에 월경이 나타난 것으로 18.6%는 월경예정일에서 7일 이후에 월경이 나타난다. 20일 이상 월경이 지연된 경우는 4 %였다.

3) 일부의 여성(8.7%)은 평균 24일간의 월경사이클이 나타난으로 대부분의 여성(86.2%)에서는 점상출혈이 나타났다. 또한 0.4%는 출혈인이 상대적으로 많이 나타난다.

4) 3상 임상시험에서 총 92명의 여성이 이 약을 1회 이상 복용하였으며(2회 투여: 73명, 3회 투여: 9명), 이들의 이상반응 경증도 및 발생률, 월경기간 또는 월경의 변화, 월경사이클의 엉수 등 인장상은 이 약을 1회 복용한 여성들과 차이가 없었다.

5) 국내 시판 후 조사 결과  
국내에서 재조사를 위하여 6년 동안 4174명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 15.6%(628/4174명, 총 714건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관 없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 있는 중대한 약물이상 반응은 보고되지 않았다. 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 다음의 표와 같다.

발현빈도	기관계	예상하지 못한 이상사례 0.02%(1/4,174명, 1건)	예상하지 못한 약물이상반응 0.02%(1/4,174명, 1건)
드물게(0.1% 미만)	생식기능 장애(여성)	질불편감	질불편감

6) 시판 후 조사에서 보고된 이상반응  
국내에서 기임기 성인 여성에서 중등도·중증 증상을 가진 자궁근증 환자의 수술 전 또는 간헐적 치료를 위한 '율리프리스탈아세테이트' 단일제 (경구제, 50mg) 제제\* 재조사를 위하여 약 6년 동안 3023명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 8.7%(264/3023명, 총 300건)로 보고되었다.

분류번호  
254

전문의약품

발현빈도	기관계 명	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 0.43% (13/3023명, 17건)	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0.17% (5/3023명, 5건)
드물게(0.1% 미만)	생식기능 장애(여성)	복통, 치질악화	질출혈
	신생물	여성유방신생물, 자궁근증	자궁근증
	심장 박동 장애	심실세동, 심장정지	
	비뇨기계 질환	배뇨곤란	
	적혈구 장애	빈혈악화	
	전신적 질환	가슴통증	가슴통증
	증후 및 말초신경계 장애	어지러움	어지러움
	혈관 질환	혈관경련	
	호흡기계 질환	기관지염 악화	
	기타 용어	자궁적출증	
때때로(0.1~5% 미만)	생식기능 장애(여성)	질출혈	

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

발현빈도	기관계 명	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 3.77%(14/3023명, 128건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 16.5%(50/3023명, 53건)
드물게(0.1% 미만)	생식기능 장애(여성)	여성생식능력감소, 외음부질염, 월경통, 자궁경부병변, 자궁염증, 질염	질염
	정신질환	부유감, 수면장애, 즐림	부유감, 수면장애, 우울증, 즐림
	피부와 부속기관 장애	기려움증, 피부질환, 발진, 접촉성피부염, 피부번색	발진, 피부색, 피부질환
	전신적 질환	기습불편증, 경련, 다리통증, 시력증, 신체불편, 열, 오한	다리통증
	호흡기계 질환	인후통, 기관지염, 감기, 기관지염 악화, 부비동염, 호흡근란	인후통
	위장관계 장애	설사, 구토, 대장통증, 위무지, 위식도역류, 위염, 위장관경련, 치질	설사, 구토, 뒤무지, 위염
	증후 및 말초신경계 장애	편두통, 감기상이, 원위부이상증상, 척추관협착, 하지불안	감기상, 원위부이상증상, 편두통
	심장 박동 장애	심실세동, 심장정지	
	비뇨기계 질환	배뇨곤란, 방광염, 번뇨, 요로감염	배뇨곤란, 번뇨
	간 및 담도계 질환	B형 간염, 간경변, 동맥간염	간경변, 동맥간염
	근육기계 장애	거친침, 골관절염, 발기증, 골관절염	거친침, 골관절염, 골관절염
	신생물	갑상선암, 여성유방신생물, 자궁근증	자궁근증
	방광증	대상포진, 칸디다증	
	콜리킨 장애	류마티스증상	
	내분비 질환	갑상선기능 저하증	
	대사 및 영양 질환	당뇨병	당뇨병
	시각장애	내장내장	
	일반적 신체증상	고혈압 악화	
	적혈구 질환	빈혈악화	
	혈관질환	혈관경련	
	기타 용어	자궁적출증, 추가판막출증, 허리디스크병변	
때때로(0.1~5% 미만)	생식기능 장애(여성)	질출혈	질출혈
	정신질환	불면증, 우울증	불면증
	피부와 부속기관 장애	두드러기	두드러기
	전신적 질환	기습통증	기습통증
	호흡기계 질환	기침	
	심장 박동 장애	두근거림	두근거림

### 5. 일반적 주의

- 1) 한 월경주기 동안 반복되거나 외연성 및 유효성에 대해서 조사되지 않았으므로, 한 월경주기동안 1회를 초과하여 사용하는 것은 충분하지 않는다.
- 2) 이 약은 충분한 피임제의 충돌을 줄여줄 수 있으므로, 이 약 복용 후, 뒤이은 성교 시 다음 생리를 시작할 때까지는 피임을 위해서 반드시 비호르몬적 국소피임법(콘돔, 살정제, 자궁내 피임장치, 피임용 캡 등을 사용해야 한다).
- 3) 상관계를 가진 후 120시간(5일) 이내에 투여한 경우에는 이 약을 투여하지 말아야 한다.
- 4) 이 약을 복용한 후 임신이 되었을 경우, 자궁 출혈이 자궁외 임신은 지체될 수 있다.
- 5) 일반적으로 이약의 복용 후, 월경은 지연되었고, 40%에서는 20% 이상의 저연이 나타났다. 이 약을 투여한 7%는 7일 이상 지연되고, 4%에서는 20% 이상의 저연이 나타났다.
- 6) 이 약을 한 월경주기 동안 1회를 초과하여 사용할 경우에는 체내 호르몬 농도가 높아져 환자에게 비정직적이고, 생리주기에 비정직하게 바뀌지 않으며, 생리주기에 실각한 장애를 미칠 가능성이 있다.