

설렘디자인연구소	루핑 점안액-공통-사용설명서	200601	
색상	Pantone 299	규격	128x182mm
글자포인트	사용설명서, 분류번호, 원료약품 및 그 분량 및 전체 7pt		
바코드규격	행간		

* 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
 * 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
 * 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



현대약품은 제약업체 최초로
CCM (한국 기업으로서
소비자 중심 경영) 실천합니다.

루핑® 점안액
(1회용)

일반의약품
분류번호 : 131
안과용제

[수입의약품]

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

■ 유효성분 : 암화나이트륨(IP) 7.4mg
영화칼륨(IP) 1.3mg
히프로멜로오스(IP) 2mg

■ 기타 첨가제 : 무수인산수소나트륨, 무수인산이수소나트륨, 수신화나트륨, 정제수, 히알루론산나트륨

[성상] 무색투명 플라스틱 용기에 든 무색투명하고 점조(끈끈하고 뻑뻑함)성이 있는 수용성 액상 점안(눈에 넣음)액

[효능·효과] 눈의 피로, 누액(눈물)의 보조(눈의 건조), 하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불쾌감, 눈의 침침함(눈곱이 많을 때 등)

[용법·용량] 1일 3~6회, 1회 1~3방울을 점안(눈에 넣음)한다. 점안(눈에 넣음) 후 남은 액과 용기는 바로 버린다.

[사용 방법]


캡 부분을 가볍고 부드럽게
돌려주세요.

뜨껑을 위로 당겨 용기와
분리시켜 주세요.

용기의 끝 부분이 눈에 닿지 않도록
하여 1회 1~3방울을 조심히 점안
(눈에 넣음)하세요.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 눈의 통증이 심한 환자
 - 2) 지금까지 안(눈)약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등)을 일으킨 적이 있는 환자
 - 3) 눈내장 환자
 - 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의해 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 2) 첨가제 : 이 약은 인산염을 포함하고 있다. 상당한 각막 손상이 있는 일부 환자에서 인산염 함유 점안액의 사용과 연관되어 각막 석회화의 사례가 매우 드물게(0.01% 미만) 보고된 바 있다.
3. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 하드콘택트렌즈를 착용하는 사람에게서 눈곱 등의 분비물이 많은 경우 드물게 렌즈가 흐리게 되는 일이 있으므로 이와 같은 경우에 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 3) 이 약 투여에 의해 눈의 침침함이 개선되지 않는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 4) 2주 정도 투여후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 5) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다(소아에 대한 용법이 있는 경우에 한함).
4. 적용상의 주의
 - 1) 이 약은 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.
 - 2) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 진균(곰팡이) 등에 의해 악액이 오염될 수 있으므로, 직접 눈에 닿지 않도록 주의 한다.
 - 3) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 않는다.
 - 4) 개봉한 후에는 1회만 즉시 사용하고, 남은 액과 용기는 바로 버린다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[포장단위] 0.5mL / 관 x 30, 0.5mL / 관 x 36

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2020년 06월 17일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundapharm.co.kr>)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎ 1644-6223)

[수입자] 현대약품 주식회사
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

[제조자] OPHTecs Toyooka Factory
26, Kamiyoshidai, Toyooka, Hyogo, Japan

제품문의처 : ☎1666-9979
사용설명서 개정연월일 : 2020.06.17


현대약품(주)

200601