

큐더스 커뮤니케이션 02-548-1976	품목명 버물리알파액 설명서	품목번호 701724	버전 221101
규격	120 x 150 mm		
글자포인트 8pt	분류번호 / 일반의약품		
글자포인트 7pt	[원료약품 및 그 분량] [성상] [효능 · 효과] [용법 · 용량] [사용상의 주의사항] [포장단위] [저장방법]		
글자포인트 6pt	CCM문구		
인쇄 색상	2도 : K(검정), pantone3262C		
비고	인쇄시 jpg 참고 / 사이즈 확인 바랍니다.		



※ 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

■ 유효성분
디펜히드라민염산염(KP) 20mg
디부카인염산염(KP) 5mg
I-멘톨(KP) 30mg
DL-캄파(KP) 30mg
에녹솔론(BP) 2mg
D-판테놀(USP) 10mg
■ 기타 첨가제 : 농글리세린, 스키케어81-41347, 시트르산, 암모니아수, 에탄올, 인산이수소칼륨, 정제수

[성상] 특이한 향이 나는 무색 액체

[효능 · 효과] 습진, 피부염, 땀띠, 옻 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드려기, 동창(언 상처)

[용법 · 용량] 1일 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
30개월 이하의 유아
2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.
1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
2) 습진, 상처부위, 민감한 피부
3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
특히, 벗겨진 피부 표면 또는 물집이 있는 부위에 다량을 사용하지 말 것
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 악이나 회장풀 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
3) 습윤(습기 찹)이나 짓무름, 염증이 심한 사람
4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
5) 소아(경련을 유발할 수 있다.)

701724-221101

| 사용설명서 |

일반의약품

KGMP

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
 - 2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
- 2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 사용할 것.
- 3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
- 4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것.
- 5) 사용 전에 잘 훔들어 사용할 것

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 두껑을 꼭 닫아 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 끄내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 4) 불 근처에 두지 말 것
- 5) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.
- 6) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.

[포장단위] 70mL/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 사용 후 뚜껑을 꼭 닫고, 용기를 세워서 보관하십시오. 눌어서 보관할 경우 액이 흘러 내릴 수 있습니다.

※ 본 제품을 먹지 마십시오.

※ 본 제품을 눈에 바르거나 분무하지(뿌리지) 마십시오.

※ 이 약을 사용함으로써 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일(2022년 11월 08일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지
(http://www.hyundaiapharm.co.kr)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎1644-6223.14-3330)

제조자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

◆ 제품문의처 : 1666-9979

◆ 사용설명서 개정연월일 : 2022. 11. 08

