| 케이엔씨 | 품 목 명 | 품목번호 | 버 전 |
|---|---|---|---|
| | 둥근머리버물리에스겔 설명서 | | 241200 |
| 규 격 | 120 x 180 mm | | |
| 인쇄규격 | | | |
| | | | |
| 글자포인트 8pt | 일반의약품, 유효성분, 효능·효과, 용법·용량 | | |
| 글자포인트 7pt | 사용상 주의사항, 저장방법 | | |
| 색 상 | PANTONE 375 C | | |
| 지종 / 코팅 | 70모조 | | |
| 후 가 공 | | | |
| 비 고 | | | |

현대약품은 제약업계 최초
CCM 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

벌레물려 가려울 땐!!! 에스겔

# 둥근머리 버물리®

BUMOOLY'S GEL

사용설명서
일반의약품
KGMP

※ 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
※ 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
※ 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

**【원료약품 및 그 분량】** 1g 중

▪ 유효성분

디펜히드라민염산염(USP) ..... 20mg
크로타미톤(USP) ..... 50mg
에녹솔론(BP) ..... 2mg
리도카인(KP) ..... 20mg
DL-캄파(KP) ..... 30mg
L-멘톨(JP) ..... 30mg

▪ 기타 첨가제

에탄올(95), 정제수, 카보머인터폴리머, 트롤아민, 폴리소르베이트80

**【성상】**

무색의 투명하며 점성이 있는 겔제

**【효능 · 효과】**

습진, 피부염, 땀띠, 옻 등에 의한 피부염, 가려움, 벌레물림, 두드러기, 동창(언 상처)

**【용법 · 용량】**

1일 1~ 수회(여러 차례) 환부(질환 부위)에 적당량을 바르십시오.

**【사용상의 주의사항】**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
30개월 이하의 유아

2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.
1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
2) 습진, 상처 부위, 민감한 피부

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
특히, 벗겨진 피부 표면 또는 물집이 있는 부위에 다량을 사용하지 말 것.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상[예를 들면 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등]이 나타난 적이 있는 사람
2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
3) 습윤(습기 참)이나 짓무름, 염증이 심한 사람
4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
5) 소아(경련을 유발할 수 있다)

241200

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기) 등의 증상이 나타나는 경우
2) 땀띠염증, 건조감, 자극감, 열감, 따끔따끔한 감각이 나타나는 경우
3) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안(눈)과 의사의 치료를 받을 것.

7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.
5) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.

**【포장단위】** 35그램 / 튜브
**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 환부(질환 부위) 이외에 사용하지 마십시오.
※ 개봉후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관하여 주십시오.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
※ 이 사용설명서 작성연월일(2024년 12월 09일)이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지 (http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

**제조의뢰자 : 현대약품(주)**
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
**제조자 : 태극제약(주)**
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

♠제품문의처 : ☎1666-9979
♠사용설명서 작성연월일 : 2024년 12월 09일

현대약품(주)