

디자인 앤드	품목명	품목번호	버전
	리나치올캡슐 375mg 설명서	700316	220903
규격	가로160mm 세로:152mm		
인쇄규격			
글자포인트 7pt	전문의약품, 원료의약품 및 그 분양, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	주의사항, 성상, 효능·효과, 용법·용량, 저장방법		
색상	별색DIC172, DIC582(백)		
지중 / 코팅	70g 모조지 또는 상용하는 지중		
후가공	없음		
비고			



서비스 헌신
소비자 중심
Since 2009
소비자 중심 경영을 실천합니다.

금·만성 기관지염
리나치올®
캡슐 375mg
(카르보시스테인)

사용설명서
일반의약품
KGMP

• 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
 • 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
 • 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료의약품 및 그 분량] 1캡슐 중
 ■ 유효성분 : 카르보시스테인(KP) 375mg
 ■ 첨가제(타르색소) : 황색203호, 녹색3호
 ■ 동물유래성분 : 유당수화물(소의 젖), 스테아르산마그네슘(소의 우지)
 ■ 기타 첨가제 : 녹색캡슐(상, 하), 아산화규소

[성상]
 백색분말이 든 녹색의 캡슐제

[효능·효과]
 1. 다음 질환에서의 객담(기비)배출곤란 : 금·만성기관지염, 기관지천식, 기관지폐장증, 인두염
 2. 만성부비동염의 배농(고름 배기)

[용법·용량]
 성인 : 카르보시스테인으로서 초기에 1회 750 mg 1일 3회 복용하고 증상이 나아지면 1회 375mg 1일 4회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 위·심이지장 복통 환자
 - 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에過민반응 환자
 - 3) 2세 미만 소아
 - 4) 이 약은 유당(젖당)을 험유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제로는 투여하면 안 된다.
 - 5) 수유부 : 수유부에 대한 인전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에서는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 6) 고령자(노인) : 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 간장에 환자
 - 2) 심장에 환자
 - 3) 위·심이지장 복통이 있는 환자
 - 4) 임부 : 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다.
 - 5) 수유부 : 수유부에 대한 인전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에서는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 복부(배부분)팽만감, 위장만출혈, 가슴쓰림, 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 설사, 구갈(목이름) 등, 민감한 환자에서 구내염입안염
- 2) 과민반응 : 때때로 발진, 흉터(붉은 반점), 슬진 등
- 3) 신경계 : 드물게 두통
- 4) 호흡기계 : 민감한 환자에서 비염(코염)
- 5) 기타 : 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감
- 6) 피부점막인증후군(스티븐스-존슨综合症, 독성피고사용해리얼증후군)
- 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 통반한 긴기능장애, 횡달
- 8) 소크, 아나필락시스모양 반응
- 9) 14일 이상 가침이 계속되는 경우
- 10) 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 1) 과량 복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.

[저장상의 주의사항]

- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관 할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에 깨어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

[포장단위] 60캡슐, 500캡슐

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 가려움이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의 하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.

※ 이 사용설명서 개정연월일2022년 09월 01일 이후 변경된 내용은 [현대약품\(주\) 홈페이지](http://www.hyundaiipharm.co.kr)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (☎ 14-3330, 1644-6223)

제조자 : 현대약품주식회사
 총청남도 천안시 동남구 풍세면 산다리길 55
 사용설명서 개정연월일 : 2022. 09. 01

◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 700316-220903