

디자인앤드	품 목 명		버전
	리나치올시럽5%라벨/500ML(콜마)		
규 격	가로:190mm 세로:90mm		210104
인 쇄 규 격	가로:50mm 세로:25mm 분리배출/바코드 8mm		
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	DIC43, DIC582(먹)		
지 중 / 코팅	아트지 / 기계코팅(불변) 또는 상응		
후 가 공	없음		
비 고			

- 이 약을 사용하기 전에 제품라벨에 기재된 사항을 자세히 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 100mL 중

- 유효성분: 카르보시스테인(KP).....5g
- 첨가제(보조제): 파라옥시벤조산메틸 0.08g, 파라옥시벤조산프로필 0.02g
- 기타 첨가제: 백당, 수산화나트륨, 시트르산염 60325, 정제수, 카라멜색소분말

[성 상] 적갈색의 시럽제

[효능·효과]

1. 다음 질환에서의 객담(가래)배출감: 급·만성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 인두염
2. 만성비염동염의 배농(고름 빠기), 심출성중이(가운데귀)염의 배액

[용법·용량]

- 성인: 카르보시스테인으로서 초기에 1회 750mg 1일 3회 경구투여하고 증상이 나아지면 1회 500mg을 1일 3회 복용한다.
 13세 이상~18세 이하: 이 약으로서 1회 250~500mg을 1일 3~4회 복용한다.
 6세 이상~12세 이하: 이 약으로서 1회 250mg을 1일 3회 복용한다.
 2세 이상~5세 이하: 이 약으로서 1일 250~500mg을 4회 분할 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 위·십이지장 궤양 환자
- 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 3) 2세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 간장애 환자
- 2) 신장애 환자
- 3) 위·십이지장 궤양의 병력이 있는 환자
- 4) 임부: 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다. 특히 임신 3개월 이내에는 투여가 권장되지 않는다.
- 5) 수유부: 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 6) 고령자(노인): 일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
- 7) 이 약은 카리멜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 복부(배부)팽만감, 위장관출혈, 가슴쓰림, 때때로

급·만성기관지염
리나치올® 시럽 5%
 (카르보시스테인)
 500mL




일반의약품

- 식약부지 위부불쾌감, 설사, 구갈(목마름) 등, 민감한 환자에서 구내염(입안염)
- 2) 과민반응: 때때로 발진, 홍반(붉은 반점), 습진 등
 - 3) 신경계: 드물게 두통
 - 4) 호흡기계: 민감한 환자에서 비염(코염)
 - 5) 기타: 때때로 가려움, 심계항진(두근거림), 콧물, 전신의 압박감
 - 6) 피부점막인중추근스티븐스-존스 증후군, 독성표피괴사증(헤리얼증후군)
 - 7) AST, ALT, ALP, LDH 상승 등을 동반한 간기능장애, 황달
 - 8) 쇼크, 아나필락시스모양 반응
 - 9) 14일 이상 기침이 계속되는 경우
- 4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항**
- 1) 과량 복용시 위세척이 유익하며, 위장장애가 가장 흔한 증상이다.
 - 2) 항생물질과 트리메토프리몰/아세트아미노펜을 함유하는 시럽제와의 혼합에서는 외관색, 탁함, 냄새 등의 변화가 일어날 수 있으므로 이들 약과의 병용(함께 복용)을 필요 할 경우에는 따로따로 복용한다.
- 5. 저장상의 주의사항**
- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉뚜껑을 꼭 닫아하여 보관할 것
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것



* 세워서 보관하세요! 눕혀서 보관할 경우 약이 흘러 내릴 수 있습니다.

210104

- [저장방법]** 기밀용기, 실온보관 **[포장단위]** 500mL/병, 1000mL/병
- * 리나치올시럽5%는 공기와 접촉시 유효성분인 카르보시스테인의 결정이 생길 수 있으니 사용 후 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오.
 - * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
 - * 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 - * 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
 - * 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 - * 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 제품라벨에 기재된 제품문의처로 문의하십시오.
 - * 제품(재)시행 개정연월일(2021년 02월 24일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundaipharm.co.kr>)나 제품문의처 ☎ 1666-9979에서 확인할 수 있습니다.
 - * 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관리안관리원 ☎14-3330, 1644-6223
 - ◆ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
 - ◆ 제품(재)시행 개정연월일 : 2021.02.24
- 제조자 :** (주)제뉴원사이언스
 세종특별자치시 전의면 산단길 245
제조의뢰자 : 현대약품(주)
 충청남도 천안시 동남구 풍서면 전대리길 55



플라스틱
 HDPE
 두껍:PP
 속뚜껍:LDPE



(01)08806420002226

제조번호 :

사용기한 :