

디자인 로 드	품 목 명	품목번호	버전
	속시탈정/설명서		221204
규 격	가로170mm 세로:200mm		
인 쇄 규 격			
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성 상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색 상	PANTONE 286C, K		
지 중 / 코팅			
후 가 공			
비 고			



소비자중심센터 | 공정거래위원회
현대약품은 제약계 최초
ccm 인증 기업으로서
소비자 중심 경영을 실천합니다.

효과 좋은 복합성분 소화제 속시탈정[®]

사용설명서
일반의약품
KGMP

- 이 약을 사용하기 전에 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어 주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중


■ 유효성분	
메타규산알루미늄산마그네슘(KP).....	40mg
((건조물이며) 산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08mg)	
탄산수소나트륨(KP).....	50mg
디아스타제·프로테아제·셀룰라제 (별규).....	20mg
(전분당화력(pH 4.5) 278단위, 단백소화력(pH 3.0) 170단위)	
스코폴리아엑스(KP).....	5mg
(총알칼로이드[히요시아민C17H23N03:289.37 및 스코폴라민(C17H21N04:303.35)]로서 50µg)	
리파제 (KP).....	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45단위)	
감초가루(생규).....	25mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)	
침강탄산칼슘(KP).....	100mg
트리메부틸말레산염(KP).....	50mg
■ 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호, 황색4호	
■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소의 우유)	
■ 기타 첨가제 : 박하유, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 그린 03B610039, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로스, 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로스나트륨, 포비돈	

[성 상] 녹색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(제산, 위체), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법·용량] 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용



왼쪽의 그림과 같이 정제가 들어있는 PTP시트의 화살표 부분을 손가락으로 강하게 눌러서 뒷면의 알루미늄을 터뜨려 꺼내어 드십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당(젓당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젓당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3) 신장에(신장장애) 환자
4) 간장에 환자
5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 2) 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본제(이 약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소해서 1g 이상인 제제는 장기연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔 다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타 크린산) 또는 차이지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

7. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키다.
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

8. 상호작용

위장진통, 진경제와 병용(함께 복용) 투여하지 않는다.

9. 소아·임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전(뚜껑)을 꼭 닫아하여 보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다

[포장단위] 10정/ PTP

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

- ※ 이 약은 물과 함께 복용하십시오.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- ※ 이 약을 투여함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.
- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 제품의 내용에 대한 문의는 구입처나 사용설명서에 표시된 제품문의처로 문의하십시오.
- ※ 이 사용설명서 개정연월일(2022년 12월 07일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(http://www.hyundaipharm.co.kr)나 제품문의처(☎ 1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(☎ 1644-6223, 14-3330)

제조사 : (주)마더스제약
전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 38 마더스제약 제2공장
제조외파자 : 현대약품(주)
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

☎ 제품문의처 : ☎ 1666-9979
사용설명서 개정연월일 : 2022. 12. 07

