

케이엔씨	품 목 명	품목번호	버전
	마이녹실겔5% 설명서/15g(Tube)	701201	220703
규격	가로:170mm 세로:280mm		
인쇄 규격	32mm * 23mm		
글자포인트 7pt	일반의약품, 원료약품 및 그 분량, 주소, 제품명		
글자포인트 7pt	성상, 효능·효과, 용법·용량, 주의사항, 저장방법		
색상	DIC305, DIC582(백)		
지정 / 코팅			
후가공			
비고			

- 이 약을 사용하시기 전에 사용설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 본 사용설명서를 잘 보관하시고, 필요시 다시 한번 읽어주십시오.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



탈모증치료제™ 마이녹실겔 5% (미녹시딜)

사용설명서
일반의약품
KGMP

[원료약품 및 그 분량] 1g 종

- 유효성분: 미녹시딜(USP) 50mg
- 기타 첨가제: 농글리세린, 에탄올, 정제수, 카보마940, 트리에탄올아민, 히드록시프로필베타데스

[성상] 무색 또는 미황색의 투명한 겔

[효능·효과] 남성형 탈모증(안드로겐탈모증)의 치료

남성형 탈모증이란?

남성형 탈모증은 휴지기 상태에 있는 모낭수에 비해 성장기 모낭수의 비율이 감소되어 모낭이 점차 축소되는 현상을 말합니다.
남성 호르몬(androgen)의 일종인 테스토스테론이 5α-환원 효소에 의해 DHT(디하이드로테스토스테론)로 변하게 되며 이 DHT가 모낭의 변화를 유도하게 되어 모발의 생장 주기 중 생장기를 짧게 하여 결국 생장주기를 거듭할수록 모낭의 크기를 위축시키므로 탈모를 유발합니다.
이 남성호르몬은 여성에게도 탈모를 일으킬 수 있는데, 그 이유는 남성의 고환에서 분비되어 탈모를 일으키는 안드로겐이 여성의 경우에도 난소와 부신(콩팥위 셈)에서 분비되기 때문입니다. 즉 남성형 탈모증은 남성에게만 발생하는 증상이 아니라 여성에게도 나타날 수 있습니다.

[용법·용량]


- 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5~1g을 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부(질환부위)에만 바른다.
- 1일 총 투여량이 2g을 초과하지 않는다.
- 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

튜브형(15g) 사용방법

본제품은 일주일씩 사용이 가능하도록 나온 제품입니다.

마이녹실겔5%의 1회 사용량은 0.5~1g이며, 제품을 4~7회 눌러서 사용할 경우 본 사용량이 됩니다.

(1회 눌러 육안으로 확인시 뾰족머리와 동일한 크기의 겔의 양이 약 0.13g입니다.)



환부(질환 부위)에 직접 사용



마이녹실겔 튜브형은 사용시 용기 끝부분으로 마사지가 가능하므로 손을 대지 않고 용기로 마사지하듯 발라줍니다.

펌프형(45g) 사용방법

본 제품은 충전된 내용물을 끝까지 모두 사용할 수 있는 에어리스(Airless) 용기가 적용된 제품입니다.

최초 사용시 5~10회 기량 펌프의 공회전이 필요하며, 최초 사용 이후에는 펌프를 누를때마다 정상적으로 분사됩니다.

마이녹실겔 5%의 1회 사용량은 0.5~1g이며, 스프레이 용기를 기준으로 약 3회~5회 분사량에 해당합니다. (1회 분사량은 약 0.2g입니다.)

1. 환부(질환부위)에 직접 분사하는 경우



스프레이 용기를 탈모 부위에 가까이 밀착한 상태에서 분사한 후, 손끝을 이용하여 환부(질환부위)에 넓게 펴서 골고루 발라 주세요.



손비단에 내용물을 분사한 후, 반대편 손끝을 이용하여 탈모 부위에 넓게 펴서 골고루 발라 주세요.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 여성 환자
 - 18세 미만 환자
 - 이 약 및 이 약 성분에過민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 심혈관계 질환 환자(관상동맥/심장동맥) 질환, 부정맥, 올혈심부전, 심장판막 질환, 치료받거나 혹은 치료받지 않은 고혈압, 저혈압 환자)
 - 탈모의 유전적 요인이 없는 환자
 - 깁작스럽게 부부적으로 탈모되는 환자
 - 두피의 홍반(붉은 반점), 염증, 감염, 자극 또는 통증, 간선(마른비늘증), 일광화상(햇볕화상) 등의 두피 이상 환자
 - 원인 불명의 탈모 환자
 - 다른 두피용 약물을 사용 중인 환자
 - 두피를 만드한 환자
 - 2 %에 내약성이 좋지 않은 환자
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것.
 - 외용 코르티코이드, 레티노이드, 바셀린, 디트라놀 또는 경피흡수를 촉진시킨다고 알려진 약들과 함께 사용하지 않는다.
 - 임상적으로 입증된 바는 없으나 구아네티틴 등의 혈관확장제를 계속 투여 중인 환자에 있어서 기침저혈압을 증가시킬 수 있다.

701201-220703

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 고령자(노인)(65세 이상 환자에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다)
- 2) 부종(부기)이 있는 환자
- 3) 갑상샘 기능 장애(갑상샘기능저하증, 갑상샘기능亢进증) 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상당시 가능하다면 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 피부 : 가려움, 인설(비늘, 갑질), 홍반(붉은 반점)/설적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 피부건조, 이 약을 바른 부위 이외의 다모증(털 과다증)(여성의 경우 안면얼굴털 성장), 모낭염, 작열감(화끈감) 및 피진(피부 발진)을 포함한 국소 자극, 박리(벗겨짐), 탈모, 피부 능양(고들진), 여드름, 조감장애(손 발톱병), 지루, 습진, 모발이상 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 설사, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.
- 3) 순환기계 : 때때로 흉통(기습·통증), 혈압변화, 막박변화, 심계항진(두근거림), 심박동의 증가, 심낭심출, 심막염, 전색혈관 막힘), 빈맥(빠른맥), 기존에 존재하던 협심증의 악화 또는 진단 받지 않은 관상동맥(심장동맥)질환자에서 협심증의 유발 등의 전신증상이 나타날 수 있다(단, 빈맥(빠른맥) 및 협심증은 베타아이드레닐린차단제 등 교감신경차단제로 조절할 수 있다).

- 4) 호흡기계 : 기관지염, 상기도 감염증, 부비동염, 호흡곤란 때때로 호흡의 단축 등이 나타날 수 있다.

- 5) 자율신경계 : 때때로 꿀절, 배통(통증)(backache), 건염(혀출염), 동통(통증), 신경염(다발신경염 등), 쇠약 등이 나타날 수 있다.

- 6) 중추신경계 : 때때로 어지럼, 두통, 꿩통증, 실신 등이 나타날 수 있다.

- 7) 강간 : 때때로 긴장이 나타날 수 있다.

- 8) 신장 : 때때로 부종(부기), 신결석, 염 및 채액자류(체액 고임) 및 부종(부기)은 필요시 이뇨제로 치료할 수 있다.

- 9) 고민반응 : 때때로 열, 두드러기, 알레르기(비염(코鼽), 전신성 홍반(붉은 반점) 및 안면부종(얼굴부기), 오한(춥고 떨리는 증상) 등이 나타날 수 있다.

- 10) 기타 : 때때로 앙구자국, 쓴맛, 이염(귀염)(특히 외이염), 미각변화, 시력장애, 발기부전, 찌르는 것 같은 아픔, 갑작스러운 원인불명의 체중증가 등이 나타날 수 있다.

- 11) 이 약의 사용으로 인해 초기에 일시적으로 탈모가 증가될 수 있는데, 2주 이상 지속될 경우

- 12) 이 약을 사용하고 4개월 후에도 효과가 없는 경우

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 이 약의 오용(잘못 사용) 및 개인의 감수성 등의 차이로 인해 과도하게 흡수되는 경우 심혈관계에 영향을 미치는 등 전신증상이 나타날 수 있으므로, 사용 전 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

- 2) 이 약을 사용하기 전에 의사 또는 약사는 환자의 건강과 두피의 이상을 확인하여야 한다. 국소 박리(벗겨짐), 피부염, 두피의 건선(마른비늘증), 심한 증상의 화상 등은 이 약의 흡수를 증가시켜 이상반응의 위험성을 증가시킬 수 있다. 또한 이 약의 사용을 고려하고 있는 환자는 병력 및 신체검사를 해 보아야 한다. 심질환의 병력이 있는 환자는 이상반응이 발생하면 특히 심한 증상이 될 수 있다는 것을 알아야 한다.

- 3) 이 약의 사용을 잊은 경우에도 용량을 보충하지 않고 그대로 다음 용량을 적용한다.

- 4) 이 약은 다음의 원인에 의한 탈모 및 기타 피부병에는 효과가 없다.
 - 약물, 영양상태(결핍, 과剩), 과민반응(비만이나 섭취), 갑상샘기능저하증, 화학요법, 두피에 흉터를 유발하는 질환, 두피에 흉터 또는 깊은 화상을 유발하는 모발관리제품, 모발을 땋는 등의 손질(지속적인 남성호르몬, 10년 이상의 장기 탈모, 선천적인 탈모)
 - 고령투여시의 처리

- 5) 고령투여시의 처리
 - 1) 이 약을 복용하거나 권장량보다 고용량을 넓은 부위에 사용 또는 두피 이외의 부위에 사용하는 경우 2%의 경우 5mL, 3%의 경우 약 3.3mL, 5%의 경우 2mL는 미녹시딜 100mg을 험용하는데 이는 고혈압 치료를 위한 성인의 경우 최대용량이다) 전신 흡수 증가로 인해 미녹시딜의 혈관확장작용과 관련된 전신적 효과가 나타날 수 있는데, 약물 과량사용의 증상 및 정후의 대부분은 체액자류, 혈액강화 및 빈맥과 관련된 심혈관계 작용이다.

- 6) 이 약을 복용한 경우 심한 증상의 이상반응을 유발할 수 있으므로 즉시 의사 또는 약사와 상의한다.

- 7) 뇌혈관내 허혈로 인해 치료될 수 있으며, 빈맥(빠른맥)은 베타아이드레닐린차단제의 복용으로 조절될 수 있다.

- 8) 저혈압 시는 생리식염 주사액을 정맥내로 투여한다. 노르에피네프린, 에피네프린과 같은 고강신경흥분제는 과도하게 심장을 자극하므로 피해야 한다.

- 9) 이 약 사용으로 눈의 화상 및 자극이 나타날 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고 눈, 벗겨진 피부 및 점막 등 민감한 부위에 이 약이 닿으면 즉시 깨끗한 물로 씻어낸다.

- 10) 헤어스타일링제는 이 약이 미만 후 사용하고, 저녁에 사용할 때는 이 약의 건조를 위해 취침 2 ~ 4시간 전에 사용한다.

- 11) 두피에서 공기 순환되면 이 약의 효과가 감소될 수 있으므로, 이 약의 건조를 축진시키기 위해 헤어드라이어를 사용하지 않는다.

- 12) 통증실험 결과 미녹시딜에 의해 암컷 마우스에서 유방암 및 부신증양이 발생하였고 수컷 랜드에서 부신 및 표피증양이 나타났다는 보고가 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 이 약은 인후성으로 화기를 피한다.

- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

- 3) 의약품을 원래 용기에서 끌어내 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 닫아 보관한다.

[포장단위] 15g / 튜브, 90g (45g/병 X 2)

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

- 이 약을 사용함으로써 알레르기증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움)이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의 하십시오.

- 오용(잘못 사용)을 막고, 품질을 보호, 유지하기 위해서 다른 용기에 넣어 사용하지 마십시오.

- 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

- 이 사용설명서 개정연월일(2022년 07월 01일) 이후 변경된 내용은 현대약품(주) 홈페이지(<http://www.hyundai-pharm.co.kr>)나 제품문의처(☎1666-9979)에서 확인할 수 있습니다.

- 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(☎14-3330, 1644-6223)

제조의뢰자 : 현대약품(주)

충청남도 천안시 동남구 풍세면 전다리길 55

제조자 : (주)제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

♣ 제품문의처 : ☎ 1666-9979

사용설명서 개정연월일 : 2022. 07. 01

