



간질환 해독의 보조 치료제

헤파멜즈[®]산

L-아스파르트산-L-오르니틴



제품정보 QR코드

[유효성분] 1포(3.6g) 중 L-아스파르트산-L-오르니틴(DAB) 3g

[첨가제] •첨가제(타르색소) : 황색5호, 적색3호

•기타 첨가제 : 과당, 히드록시프로필셀룰로오스, 시트르산, 복숭아분말향(91316), 아스파탐, 아세실팜칼륨

[용법·용량] L-아스파르트산-L-오르니틴으로서 1회 6g, 1일 2회 많은 양의 물에 녹여 식후에 복용한다.

[성상] 분홍색의 산제

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용상의 주의사항]

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1일 허용량제한: 아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정 (가능한 한 최소량 사용) 하십시오.
60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

심한 신부전 환자(혈청크레아티닌수치가 3mg/100mL 이상)

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 아세틸살리실산에 알레르기가 있는 사람(특히 천식을 포함한 알레르기가 일어날 수 있습니다.)
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
- 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지키십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

※ 본 제품을 투여하기 전에 본 포장재의 사용설명을 주의깊게 읽어야 하며, 본 포장재는 제품과 함께 보관하십시오.

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 대한 의문사항 및 본 포장재의 최종작성 일자(2022년 07월 21일)이후 변경된 내용은 한화제약 홈페이지(www.hwpharm.com) 또는 한화제약 학술팀(Tel:02-959-3679)으로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품 안전관리원(1644-6223), 부작용 피해구제 전용상담 (14-3330)



헤파멜즈[®]는 독일 Merz Pharmaceuticals社에서 개발한 L-ornithine-L-aspartate가 주성분인 오리지널 간장질환 치료제입니다.

제조사

한화제약
강원도 춘천시 남면 약암길 109

판매자

현대약품(주)
충남 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55

원료공급 · 기술제공

Merz Pharmaceuticals GmbH
Pharma Germany